

穂いもちの発生に注意

平成27年9月4日
J A 福山市

7月29日付で水稻穂いもちの注意報が発令されておりますが、8月27日の出穂期以降、降雨が続いており、今後も曇雨天が続く見込みで穂いもちが発生しやすい状況となっております。

出穂後2週間以内に下記の防除薬剤で防除を行ってください。

葉いもち



穂いもち



(防除のポイント)

- 1) 止葉を含む上位3葉に葉いもちの発生しているところは、必ず防除する。
- 2) いもち病の常発地域では出穂後の穂揃期の防除も徹底する。
- 3) 雨が続く場合でも、合間をぬって防除を行う。
散布後3時間降雨がないことが望ましい。
- 4) いもちの常発地で、出穂後に天候不良が続く場合は、穂揃期の防除後7～10日目に再度防除する。

・いもち病防除薬剤

薬剤名	剤型	使用量・希釈倍数	使用時期	使用回数
ブラシン	粉剤DL	4kg	収穫7日前まで	2回
	フロアブル	1,000倍	収穫7日前まで	2回
ブラシンジョーカー	粉剤DL	4kg/10a	収穫21日前まで	2回以内
	フロアブル	1,000倍	収穫21日前まで	2回以内

使用倍率や収穫前日数は、農薬使用基準を守って使用してください。